

Antibiothérapie prophylactique

(d'après Afssaps, juillet 2021 et HAS, avril 2024)

Actes bucco-dentaires invasifs	Patient		
	population générale	immunodéprimé	à haut risque d'endocardite infectieuse

• En endodontie

Mise en place d'une digue	-	-	R _B
Soins endodontiques :			
Traitement des dents à pulpe vitale	-	R	R
Traitement des dents à pulpe nécrosée	-	R	R
Reprise de traitement†	-	R†	R
Chirurgie périapicale :			
Sans comblement à l'aide d'un substitut osseux	- A	R	R
Avec comblement à l'aide d'un substitut osseux	-	R	R**

• En parodontologie

Actes et soins parodontaux :			
Détartrage avec et sans surfaçage radiculaire	-	R	R _B
Sondage parodontal	-	R	R _B
Chirurgie parodontale :			
Allongement de couronne clinique	-	R*	R
<i>Chirurgie de la poche :</i>			
Lambeau d'accès	- C	R*	R
Comblement et greffes osseuses	-	R*	R
Membrane de régénération osseuse	- B	R*	acte contre-indiqué
Protéines dérivées de la matrice amélaire	- B	R*	R
<i>Chirurgie plastique parodontale :</i>			
Lambeau d'accès	-	R*	R
Greffe gingivale	-	R*	R

• Pour les avulsions dentaires et transplantations

Avulsion dentaire :			
Dent sur arcade, alvéolectomie, séparation de racines	-	R	R _B
Amputation radiculaire	-	R	R
Dent de sagesse mandibulaire incluse	R _A	R	R _B
Dent incluse (hors dent de sagesse mandibulaire), dent en désinclusion, germectomie	R	R	R _B
Chirurgie préorthodontique des dents incluses ou enclavées	R	R	R
Autotransplantation	R	R*	R

• Pour les chirurgies des tissus durs et des tissus mous

Chirurgie osseuse (hors actes de chirurgie maxillo-faciale et ORL)	R	R‡	R _B
Exérèse des tumeurs et pseudotumeurs bénignes de la muqueuse buccale	-	R‡	R _B
Freinectomie	-	R‡	R _B
Biopsie des glandes salivaires accessoires	-	R‡	R _B

Actes bucco-dentaires invasifs	Patient		
	population générale	immunodéprimé	à haut risque d'endocardite infectieuse

• Pour les actes chirurgicaux en implantologie

Chirurgie préimplantaire :			
Élévation du plancher sinusien avec ou sans matériau de comblement	R	R	R**
Greffe osseuse avec ou sans matériau de comblement	Rc	R	R
Membrane de régénération osseuse	R		acte contre-indiqué
Chirurgie implantaire :			
Pose de l'implant	-	R*	R**
Dégagement de l'implant	-	R*	R
Chirurgie des péri-implantites :			
Lambeau d'accès, comblement, greffe osseuse, membrane	-	R*	acte contre-indiqué

• Pour les autres actes bucco-dentaires invasifs

Anesthésie locale ou locorégionale dans un tissu non infecté	-	-	-
Anesthésie locale intraligamentaire/technique ostéocentrale	-	R***	R
Soins prothétiques à risque de saignement	-	R	R _B
Soins orthodontiques à risque de saignement	-	R	R _B

- : prescription non recommandée.

R : prescription recommandée.

En indice (A, B ou C) : grade de la recommandation. Si celui-ci n'est pas indiqué, comprendre qu'il y a « accord professionnel ».

† : avec ou sans lésion inflammatoire périradiculaire d'origine endodontique (L.I.P.O.E.).

‡ : Chez le patient immunodéprimé, l'intérêt de l'antibiothérapie prophylactique doit être déterminé en fonction du risque infectieux.

* : Chez le patient immunodéprimé, le rapport entre bénéfice de l'intervention et risque infectieux devra être pris en compte.

** : Sans utilisation d'une membrane de régénération osseuse (contre-indication)

*** : Chez le patient immunodéprimé, le rapport

• Schéma d'administration préconisé pour l'antibiothérapie prophylactique

Situation	Antibiotique	Prise unique dans l'heure qui précède l'intervention	
		Adulte Posologies quotidiennes établies pour un adulte à la fonction rénale normale	Enfant Posologies quotidiennes établies pour un enfant à la fonction rénale normale, sans dépasser la dose adulte
Sans allergie aux pénicillines	Amoxicilline	2 g – v.o.	50 mg/kg – v.o.
En cas d'allergie aux pénicillines	Azithromycine	500 mg – v.o.	15 mg/kg – v.o.
Contre-indication formelle patient ayant /traité allongement intervalle QT	Pristinamycine	1 g – v.o.	25 mg /kg – v.o. RAE hors AMM, contre-indications enfant de moins de 6 ans